

Edition

Cultures Spéciales

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

REGION CENTRE

Supplément N° 42 au Bulletin technique N° 24.

10 Août 1994

- EDITION VIGNE 21 -

MILDIOU	: Récentes taches sur feuilles.
BLACK-ROT	: Grosses attaques sur feuilles et grains. Maintenir la protection jusqu'à véraison.
OIDIUM	: Peu d'attaques ; à l'approche de la véraison, les grappes seront moins sensibles.
BOTRYTIS	: Légères attaques ; prévoir le dernier traitement à l'approche de la véraison.
VERS DE LA GRAPPE	: Vols restreints d'Eudemis et de Cochylis. Ne plus traiter.
ACARIENS	: Ne pas relâcher la surveillance de vos parcelles.

*** STADES PHENOLOGIQUES ***

Le début véraison semble bien engagé sur cépage Pinot Noir à Cheverny, St Romain (41) et sur Gamay à St Romain.

*** INFORMATIONS CLIMATIQUES ***

Les températures sous abri, observées à Fleury les Aubrais (45) ces derniers jours, sont restées largement supérieures aux normales saisonnières, allant de 24 à 27° C.

De violents orages, parfois accompagnés de grêle, ont eu lieu le 7 Août occasionnant de gros dégâts au vignoble du Loir et Cher (Cheverny, Fougères, Monthou, Meusnes) et dans le Loiret (Chécy). La pluviométrie se situait entre 21 et 40 mm suivant les secteurs touchés. Ce phénomène orageux s'est renouvelé dans la soirée du 9 Août avec de fortes bourrasques de vent, parfois de la grêle (Quincy -18-) et une pluviométrie allant de 26 à 50 mm suivant les secteurs.

*** MILDIOU ***

De nouvelles taches sur feuilles sont apparues consécutivement aux pluies d'orage du 7 Août, notamment à Oisly, Cheverny (41).

Suite au lessivage par ces pluies d'orage des 7 et 9 Août et en présence d'attaque toute récente, effectuez une application avec des produits à base de cuivre ou en association avec du cymoxanil.

*** BLACK-ROT ***

On a pu observer de sérieuses attaques sur feuilles et sur grappes (cépage Gamay), notamment dans le Loir et Cher (Oisly, St Romain).

Il est encore temps de protéger les grappes par l'utilisation de produit mixte Mildiou/Black-rot. Dans les secteurs fortement attaqués où la récolte est mise en péril, l'utilisation d'un IBS pourra être effectuée en observant la cadence d'application à 14 jours en tenant compte des phénomènes de résistance (ne pas dépasser 2 à 3 applications maximum).

direction régionale de l'agriculture et de la forêt

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX CENTRE
93, rue de Courmoult - BP 210 - 45403 FLEURY LES AUBRAIS Cedex

ARBORICULTURE : 250 F
VITICULTURE : 220 F

P100



*** OIDIUM ***

De nouvelles attaques ont été observées à St Romain (41) et Lye (36).

Sur parcelles fortement contaminées, effectuez un traitement en tout début de véraison.

En l'absence d'attaque et à l'approche de la véraison, la protection contre l'Oïdium pourra être arrêtée.

*** BOTRYTIS ***

Des foyers ont été observés, bien souvent dus à des dégâts de Vers de la grappe.

Reprenez les indications du bulletin n° 20 du 3 Août dernier. La protection anti-Botrytis est soumise aux facteurs climatiques et devra être faite avant la véraison.

*** VERS DE LA GRAPPE ***

COCHYLIS, EUDEMIS :

Les vols de deuxième génération sont en nette régression.

Une intervention n'est plus nécessaire. En cas de fortes attaques, un traitement curatif avec du parathion pourrait être réalisé.

*** ACARIENS ***

Pas d'évolution des populations.

Maintenez la surveillance de vos parcelles et n'intervenez qu'en cas de dépassement du seuil de tolérance. Respectez bien les délais d'emploi avant récolte.